



PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A VIOLENCIA DE PAREJAS EN GESTANTES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN CARTAGENA. COLOMBIA



Chabeli Flórez-Monterrosa, Álvaro Monterrosa-Castro, Mercado-Lara María
 Grupo de Investigación Salud de la mujer. Facultad de Medicina. Universidad de Cartagena.

INTRODUCCIÓN: La violencia de pareja (VP) es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como toda acción o comportamiento dentro de una relación íntima que ocasione daño físico, psíquico o sexual, siendo los compañeros o excompañeros conyugales usualmente los agentes agresores. Asimismo, la VP es un problema de salud pública mundial, que no es exclusivo de determinados estratos socioeconómicos, grupos religiosos o culturales.

OBJETIVO: Determinar la frecuencia de VP e identificar factores asociados en un grupo de gestantes adolescentes Cartageneras.

METODOLOGÍA: Estudio transversal realizado en 355 embarazadas entre 10-19 años, que acudieron a control prenatal en centros de salud ambulatorio de primer nivel o a la consulta externa de la Clínica de Maternidad Rafael Calvo, Cartagena, Colombia. Participación voluntaria y anónima. Las adolescentes y sus tutores firmaron consentimiento informado previo a la aplicación de la encuesta. Con aval del comité de ética de la Universidad de Cartagena, Colombia. Se aplicó formulario de características sociodemográfico de la gestante y de su compañero sexual, así como la Escala de Violencia e Índice de Severidad de Violencia de Pareja (EV-ISVP). Análisis Epi-Info-7.

P<0,05 indica significancia estadística

Características Sociodemográficas			
Variable	Con violencia de pareja 75 (21.1%)	Sin violencia de pareja 280 (78,9%)	p
Edad Me [RI]	18.1 [16.0 - 18.0]	17.0 [16.0 - 19.0]	1.00
Unión libre n(%) [95%IC]	57(76.0) [64.7-85.1]	242 (86.4) [81.9-90.2]	0.04
Deseo de interrumpir embarazo, n(%) [95%IC]	14 (18.7) [10.6-29.3]	39 (13.9) [10.1-18.1]	0.30

Prevalencia de tipos de VP	
VP Psicológica	19.5%
VP Física Sin Arma	12.2%
VP Sexual	3.1%
VP Física Con Arma	2.3%

Factores Asociados a VP		
Variable	OR [IC 95%]	P
Convivir con más de cinco Personas	0.52 [0.29 – 0.94]	0.03
Uso de Métodos de Planificación Familiar antes del Embarazo	0.32 [0.16 – 0.63]	0.001
Actividad Laboral del Compañero	0.25 [0.09 – 0.64]	0.004
Factor Asociado a VP Psicológica		
Vivir en Unión Libre	2.37 [1.16 – 4.84]	0.01
Factor Asociado a VP Sexual		
Consumo de Alcohol por el Compañero	4.25 [0.80 – 22.56]	0.05

CONCLUSIÓN: En el estudio se encontró frecuencia de VP del 21,1%. El tipo de violencia más frecuente fue VP psicológica. Se identificaron varios factores psicosociales asociados a VP. El consumo de alcohol por el compañero sexual incrementó en cuatro veces la VP sexual.

