1 er Encuentro Nacional de investigadores en Salud Femenina



FACTORES ASOCIADOS A SOMNOLENCIA DIURNA EXCESIVA EN GESTANTES DE BAJO RIESGO


Monterrosa-Castro Álvaro, Romero-Martínez Shairine, Rocha-Arias Jasmín



La Somnolencia Diurna Excesiva (SDE) es la Probabilidad de Quedarse Dormido en el Tiempo en que se Debería Estar Despierto

Objetivo: Estimar la Prevalencia de Somnolencia Diurna Excesiva e Identificar Factores Asociados

Metodología: Estudio Transversal, Proyecto de Investigación MORFEM (Estudio Sueño en Mujeres Colombianas) Avalado por Universidad de Cartagena. Valoración en Gestantes de Bajo Riesgo de Consulta Externa de Clínica Santa Cruz De Bocagrande, Cartagena. Se Interrogaron Características Sociodemográficas, Percepción de Cansancio, Ansiedad y Estres. Se Aplicaron tres escalas: *Escala de Somnolencia de Epworth (ESE) *CESD-10 (Evalúa Depresión). *PSS-10 (Escala De Estrés Percibido). Participación Anónima, Voluntaria, Aprobación Comité de Ética, Análisis Epi-info-7. Coeficiente de Correlación: Epworth con CESD-10 Y Epworth con PSS-10.



REGRESIÓN LOGÍSTICA UNIVARIADA			
Ansiedad en embarazo	2,69 [1,27-3,35]	0,003	
Cansancio en embarazo	2,08 [1,23-3,52]	0,005	
Estrés en el embarazo	1,57 [1,00-2,47]	0,046	

n=683			
28,3 ± 6,3			
31,5 ± 6,9			
25 ± 5,2			
28,2 ± 4,6			
12 ± 2,7			
6,3 ± 4,9			
13,2 ± 5,2			
153 (22,4)			
56 (8,2)			
142 (20,7)			
446 (65,3)			
227 (33,2)			
31 (4,5)			
18 (2,6)			
80 (11,7)			
121 (17,7)			
50 (7,3)			
3 (0,4)			
15 (2,2)			
157 (22,9)			
511 (74,8)			

COEFICIENTE DE CORRELACION DE ESCALA DE SOMNOLENCIA DE EPWORTH			
Variable	rho	[IC 95%]	Р
CESD-10	0,147	0,073 to 0,220	0,0001
PSS	0,116	0,041 to 0,189	0,0024

Conclusión: la prevalencia de SDE fue 13,4%, ansiedad, estrés, cansancio y depresión se asociaron significativamente