

1er Encuentro Nacional de investigadores en Salud Femenina

PO-05




FRECUENCIA DE LOS SINTOMAS DEL SINDROME GENITOURINARIO DE LA MENOPAUSIA EN AFRODESCENDIENTES DEL CARIBE COLOMBIANO. VALORACION CON VULVOVAGINAL SYMPTOMS QUESTIONNAIRE (VSQ)

Monterrosa-Castro Álvaro, Redondo-Mendoza Velia, Monterrosa-Blanco Angélica, Buelvas-De la rosa Camila

INTRODUCCIÓN: El Síndrome Genitourinario de la Menopausia (SGM) es un Grupo de Signos y Síntomas Vulvovaginales y Genitourinarios, Producto del Déficit Estrogénico.

OBJETIVO: Valorar el SGM en Climatéricas Afrodescendientes del Caribe Colombiano y Estimar su Asociación con el Estado Menstrual y Etapa Menopáusica.

Estudio Transversal En Mujeres Saludables, Autoreconocidas como Afrodescendientes. Edad 40-59 Años. Captadas en sus Residencia en Poblaciones del Caribe Colombiano. Se Aplicó Formulario con Información Sociodemográfica y "Vulvovaginal Symptoms Questionnaire" (VSQ), que Evalúa con 21 Ítems, la Presencia de Síntomas Vulvovaginales y su Impacto Emocional, Sexual y en la Vida. Se Realizó Regresión Logística No Ajustada, Considerando por Separado como Variable Dependiente cada uno de los Ítems Del VSQ. Variables Independientes: Estado Menstrual (Premenopáusico/Posmenopáusico) y Etapas Menopáusicas (Premenopausia, Posmenopausia Temprana y Tardía). Análisis EPI-INFO 7. $P < 0,05$: Estadísticamente Significativo. Participación Voluntaria, Con Consentimiento Informado.



Asociación entre Estado Menstrual y Etapas Menopáusicas con Sequedad Vaginal Durante el Coito

	OR [IC95%]	P
Premenopausia	1	
Posmenopausia	5,5 [3,2-9,5]	<0,001
Posmenopausia Temprana	3,1 [1,9-5,1]	<0,001
Posmenopausia Tardía	2,3 [1,3-4,1]	0,004

CONCLUSIONES.

En un Grupo de Mujeres Afrodescendientes en Climaterio, Irritación y Prurito, Fueron los Síntomas Más Informados. La Posmenopausia y sus Etapas se Asociaron a Mayor Presencia de Sequedad Vaginal Durante el Coito.

Características Sociodemográficas n=369 X±SD o n (%) [IC95%]

Edad	49,1±5,8
Premenopáusicas	191 (51,8) [46,5-56,9]
Posmenopáusicas	178 (48,2) [43,0-53,5]
Posmenopáusicas Tempranas	118/178 (66,3) [58,8-73,2]
Posmenopáusicas Tardías	60/178 (33,7) [26,8-41,2]
ÍMC	27,9±5,4
Sexualmente activas	318 (86,2) [82,1-89,4]
R. sexuales semanal	2,0±1,9
Edad de la pareja	41,9±22,2