



Antecedente del Síndrome de Ovario Poliquístico y su Asociación con Deterioro Psicológico en Posmenopáusicas Sobrevivientes al Cáncer de Seno, Residentes en Cartagena, Colombia



Mercado-Lara Maria, Monterrosa-Castro Álvaro.


Grupo de Investigación Salud de la Mujer. Universidad de Cartagena, Colombia

El proyecto de investigación CAVICSEN fue ganador en la convocatoria a Jóvenes investigadores Talento Médico-2020 (No. 874) Min-Ciencias, Colombia

Objetivo: evaluar la asociación entre el antecedente de Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), identificado antes del diagnóstico de cáncer de seno con el deterioro psicológico, en posmenopáusicas residentes en el caribe colombiano.

- Estudio transversal
- Proyecto de investigación CAVICSEN (Calidad de Vida en Sobrevivientes al Cáncer de Seno)
- Posmenopáusicas con doce o más meses de diagnóstico de cáncer de seno que asistieron a centros oncológicos, fundaciones sociales o redes de apoyo en Cartagena, Colombia.
- Participación anónima y voluntaria.
- Aprobado por el comité de ética de la Universidad de Cartagena

Herramientas: características sociodemográficas, datos clínicos ginecológicos y oncológicos, Menopause Rating Scale (MRS)
Presencia de deterioro psicológico (Puntuación del dominio psicológico MRS mayor a uno). Análisis estadístico: Epi-Info 7. Regresión logística no ajustada: Deterioro dominio psicológico (V. dependiente) y SOP (V. independiente)



n=299	
Edad, X ± SD	58,8 ± 9,6
Años de estudio, X ± SD	10,4 ± 5,2
IMC, X ± SD	26,9 ± 4,4
Meses de diagnóstico, X ± SD	70,4 ± 63,5
Etnia mestiza, n (%) [IC95%]	249 (83,2) [78,5-87,3]
Ama de casa, n (%) [IC95%]	245 (81,9) [77,1-86,1]
Síndrome de Ovario Poliquístico	30 (10,0) [6,8-14,0]

152 mujeres (52,8%) presentaban deterioro psicológico

Asociación entre el antecedente de Síndrome de ovario poliquístico con el deterioro psicológico
 OR: 2,68 [IC95%:1,1-6,2], p=0,02

Síntomas Psicológicos de la Menopausia	N (%) [IC95%]
Irritabilidad	114 (38,1) [32,6-43,9]
Ansiedad	128 (42,8) [37,1-48,6]
Cansancio físico/mental	160 (53,5) [47,6-59,2]
Estado de ánimo depresivo	104 (34,7) [29,3-40,4]

Conclusión:
 El antecedente de síndrome de ovario poliquístico se asoció con dos y media veces mayor frecuencia de deterioro psicológico, valorado por escala MRS en un grupo de posmenopáusicas sobrevivientes al cáncer de seno

